

О НЕКОТОРЫХ ПРЕДЕЛЬНЫХ МНОЖЕСТВАХ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОЗНАЧНЫХ ФУНКЦИЙ

С.Л. БЕРБЕРЯН

Аннотация. Статья посвящена изучению множеств $K_*(f)$ и $F_*(f)$ для нормальных непрерывных и гармонических функций.

В дальнейшем будем придерживаться общепринятых обозначений (см., например, [1]). Обозначим через D и Γ соответственно единичный круг $|z| < 1$ и единичную окружность $|z| = 1$. точке $\xi = e^{i\theta} \in \Gamma$. Интерпретируя круг D , как модель плоскости в геометрии Лобачевского, обозначим через $\sigma(z_1, z_2)$ неевклидово расстояние между произвольными точками z_1, z_2 из круга D :

$$\sigma(z_1, z_2) = \frac{1}{2} \ln \frac{1+u}{1-u}, \text{ где } u = \left| \frac{z_1 - z_2}{1 - z_1 \bar{z}_2} \right|.$$

Рассмотрим действительную функцию $f(z)$. Для произвольного подмножества S круга D , для которого точка $\xi \in \Gamma$ является предельной точкой, обозначим через $C(f, \xi, S)$ предельное множество функции $f(z)$ в точке ξ относительно множества S , т.е. $C(f, \xi, S) = \overline{\bigcap f(S \cap U(\xi))}$, где пересечение берётся по всем окрестностям $U(\xi)$ точки ξ , а черта означает замыкание множества относительно двухточечной компактификации \bar{R} множества $R = (-\infty, +\infty)$ в виде отрезка посредством добавления к точкам множества R символов $-\infty$ и $+\infty$. Пусть $A(\xi)$ - орицикл круга D в точке ξ , т.е. окружность радиуса меньше единицы, касающаяся изнутри окружности Γ в точке ξ . Два орицикла, $A^1(\xi), A^2(\xi)$ круга D в точке ξ ограничивают некоторую односвязную область, которую называют орициклическим

1991 *Mathematics Subject Classification.* 31A05, 30D45

Ключевые слова: нормальные непрерывные функции, орицикл, орициклический угол, предельные множества, неевклидово расстояние.

углом и обозначают через $O\Delta(\xi)$. Диаметр круга D , проведенный в точку $\xi \in \Gamma$, делит $O\Delta(\xi)$ на две равные части, называемые левым орициклическим углом $O\Delta(\xi)$ и правым орициклическим углом $O^+\Delta(\xi)$ в точке $\xi \in \Gamma$. Для гармонической в D функции $f(z)$ рассмотрим предельные множества $C(f, \xi, O^+\Delta(\xi))$ и $C(f, \xi, O\Delta(\xi))$ в точке $\xi \in \Gamma$ по правому и левому орициклическим углам $O^+\Delta(\xi)$ и $O\Delta(\xi)$, и следуя Багемилу (см. [2], [3]), назовем точку $\xi \in \Gamma$ орициклической точкой Фату функции $f(z)$, если множество $UC(f, \xi, O\Delta(\xi))$, в котором объединение берется как по всем правым орициклическим углам $O^+\Delta(\xi)$, так и по всем левым орициклическим углам $O\Delta(\xi)$, состоит из единственного значения $\{\alpha\}$, $\alpha \in \bar{R}$. В этом случае скажем, что функция $f(z)$ имеет в точке $\xi \in \Gamma$ орициклический граничный предел α . Через множество $F_*(f)$ обозначим множество орициклических точек Фату для функции $f(z)$. Точку $\xi \in \Gamma$ отнесем к множеству $K_*(f)$ для функции $f(z)$, определенной в D , если $C(f, \xi, O^1\Delta(\xi)) = C(f, \xi, O^2\Delta(\xi))$ для любых орициклических углов $O^1\Delta(\xi)$ и $O^2\Delta(\xi)$ в точке ξ . Известно (см. [3]) следующее свойство орициклов: для произвольных точек z_1 и z_2 , лежащих на орицикле $A^1(\xi)$ и произвольного другого орицикла $A^2(\xi)$ имеем $\sigma(z_1, A^1(\xi)) = \sigma(z_2, A^2(\xi)) = const$. Понятие нормальной функции, рассмотренное для мероморфных функций и состоящее в свойстве порождать нормальное семейство на группе T всех конформных автоморфизмов области определения, было затем перенесено на гармонические и субгармонические функции. В случае единичного круга D группа T состоит из элементов

$$T = \{S(z); S(z) = e^{i\alpha}(z+a) \cdot (1+\bar{a}z)^{-1},$$

a - произвольная точка в D , α - произвольное действительное число}. Скажем, что действительнзначная функция $f(z)$, определенная в D , нормальная, если на группе T всех конформных автоморфизмов единичного круга D порождаемое ею семейство функций $\Phi: \{f(S(z)); S(z) \in T\}$ нормально в D в смысле Монтеля, т. е. из любой последовательности $\{f(S_n(z))\}$, семейства Φ , где $S_n(z) \in T$, можно извлечь подпоследовательность $\{f(S_{n_k}(z))\}$, равномерно сходящуюся на любом компакте K в D или равномерно расходящуюся к $-\infty$ или к $+\infty$ на K .

Последовательность точек $\{z_n\}, z_n \in D, n = 1, 2, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = 1$, следуя (см. [4]) В.И.Гаврилову, называют P -последовательностью, если для любой подпоследовательности $\{z_{n_k}\}$ и любого $\varepsilon > 0$ в объединении $\bigcup_{k=1}^{\infty} D(z_{n_k}, \varepsilon)$ неевклидовых кругов $D(z_{n_k}, \varepsilon)$ с неевклидовыми центрами z_{n_k} и неевклидовыми

радиусами $\varepsilon > 0$ мероморфная функция $f(z)$ принимает бесконечно часто каждое комплексное значение, за исключением, быть может, двух. Применительно к гармоническим функциям (см. [5]), последовательность точек $\{z_n\}, z_n \in D, n = 1, 2, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} |z_n| = 1$, называем P' -последовательностью, если для любой подпоследовательности $\{z_{n_k}\}$ имеет место следующее утверждение: каково бы ни было число $\varepsilon > 0$ в объединении $\bigcup_{k=1}^{\infty} D(z_{n_k}, \varepsilon)$ неевклидовых кругов $D(z_{n_k}, \varepsilon)$ с неевклидовыми центрами z_{n_k} и неевклидовыми радиусами $\varepsilon > 0$ гармоническая функция $f(z)$ принимает бесконечно часто каждое конечное действительное значение.

Теорема 1. Пусть $f(z)$ - нормальная непрерывная в D функция. Для того, чтобы точка $\xi = e^{i\theta} \in \Gamma$ была точкой из множества $K_*(f)$, необходимо и достаточно совпадение предельных множеств $C(f, \xi, \Lambda(\xi))$ для множества орициклов $\Lambda(\xi)$, всюду плотных на множестве орициклических углов $OA(\xi)$.

Предварительно докажем 2 леммы.

Лемма 1. Пусть $f(z)$ - нормальная непрерывная функция в D и имеет место совпадение предельных множеств $C(f, \xi, \Lambda(\xi))$ для множества орициклов $\Lambda(\xi)$, всюду плотных на множестве орициклических углов $OA(\xi)$ в точке $\xi = e^{i\theta}$. Тогда совпадение предельных множеств $C(f, \xi, \Lambda(\xi))$ имеет место для любых орициклов $\Lambda(\xi)$.

Доказательство. В силу непрерывности функции $f(z)$ и связности орициклов предельные множества $C(f, \xi, \Lambda(\xi))$ для указанных в лемме 1 орициклов $\Lambda(\xi)$ совпадают с некоторым замкнутым промежутком $[\alpha, \beta]$, причем возможно, что $\alpha = -\infty$ или $\beta = -\infty$. Докажем, что и для любого орицикла $\Lambda_1(\xi)$ предельное множество $C(f, \xi, \Lambda_1(\xi))$ совпадает с $[\alpha, \beta]$. Рассмотрим такую последовательность орициклов $\Lambda_n(\xi)$, предельные множества вдоль которых совпадают с $[\alpha, \beta]$ и которые стягиваются к орициклу $\Lambda_1(\xi)$. Пусть γ - произвольное число, принадлежащее промежутку $[\alpha, \beta]$. Тогда на каждом орицикле $\Lambda_n(\xi)$ найдется такая последовательность $\{z_n^k\} \rightarrow \xi$ при $k \rightarrow \infty$, что $\lim_{k \rightarrow \infty} f(z_n^k) = \gamma$. Используя свойство орициклов [3], выделим из этого множества последовательностей такую подпоследовательность $\{z_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, чтобы $\lim_{k \rightarrow \infty} z_{n_k} = \xi$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \sigma(z_{n_k}, \Lambda_1(\xi)) = 0$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} f(z_{n_k}) = \alpha$. Отметим на $\Lambda_1(\xi)$ такую последовательность $\{t_k\}_{k=1}^{\infty}$, для которой

$\sigma(z_{n_k}, t_k) = \sigma(z_{n_k}, \Lambda_1(\xi))$, $k = 1, 2, \dots$. Следовательно, $\lim_{k \rightarrow \infty} \sigma(z_{n_k}, t_k) = 0$, причем имеем $\lim_{k \rightarrow \infty} f(z_{n_k}) = \gamma$. Согласно известному свойству нормальных непрерывных функций [6] $\lim_{k \rightarrow \infty} f(t_k) = \gamma$ и значит, $\gamma \in C(f, \xi, \Lambda_1(\xi))$. Поэтому получим, в силу произвольности числа γ , что $C(f, \xi, \Lambda_1(\xi)) \supset [\alpha, \beta]$. Докажем справедливость следующего соотношения:

$$C(f, \xi, \Lambda_1(\xi)) = [\alpha, \beta] \quad (1)$$

Без нарушения общности допустим, что $\alpha \neq -\infty$ и $\lambda < \alpha$. Отметим на $\Lambda_1(\xi)$ такую последовательность $\{t_k\}_{k=1}^{\infty}$, для которой

$$\lim_{k \rightarrow \infty} f(t_k) = \lambda \quad (2)$$

При любом фиксированном n отметим на $\Lambda_n(\xi)$ такую последовательность $\{z_k^{(n)}\}_{k=1}^{\infty}$, для которой $\sigma(z_k^{(n)}, t_k) = \sigma(z_k^{(n)}, \Lambda_1(\xi))$, $k = 1, 2, \dots$. Изменяя n получим множество последовательностей $z_1^{(1)}, z_2^{(1)}, \dots, z_k^{(1)}, \dots; z_1^{(2)}, z_2^{(2)}, \dots, z_k^{(2)}, \dots; z_1^{(n)}, z_2^{(n)}, \dots, z_k^{(n)}, \dots$. Снова используя свойство орициклов, выделим из этого множества последовательностей такую подпоследовательность $\{z_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, чтобы $\lim_{k \rightarrow \infty} z_{n_k} = \xi$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \sigma(z_{n_k}, \Lambda_1(\xi)) = 0$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} f(z_{n_k}) = \gamma \geq \alpha$. Сравнивая последний предел с соотношением (2), придем к противоречию со свойством для нормальных непрерывных функций (см. [6]). Полученное противоречие доказывает справедливость соотношения (1) и тем самым утверждение леммы 1 доказано.

Лемма 2. Для любой точки $\xi \in K_*(f)$ произвольной нормальной непрерывной функции $f(z)$ справедливо равенство $C(f, \xi, O\Delta(\xi)) = C(f, \xi, \Lambda(\xi))$ для любого орицикла $\Lambda(\xi)$ и любого орициклического угла $O\Delta(\xi)$.

Доказательство. Допустим противное, т.е. существует такое значение $\alpha \in \bar{R}$, что $\alpha \in C(f, \xi, O\Delta(\xi))$ для любого орициклического угла $O\Delta(\xi)$, но $\alpha \notin C(f, \xi, \Lambda(\xi))$. Рассмотрим последовательность орициклических углов

$$O^1 \Delta(\xi) \supset O^2 \Delta(\xi) \supset \dots \supset O^n \Delta(\xi) \supset \dots,$$

стягивающихся к орициклу $\Lambda(\xi)$ и множество последовательностей $z_1^{(1)}, z_2^{(1)}, \dots, z_k^{(1)}, \dots; z_1^{(2)}, z_2^{(2)}, \dots, z_k^{(2)}, \dots; z_1^{(n)}, z_2^{(n)}, \dots, z_k^{(n)}, \dots$, где при любом фиксированном n последовательность точек $\{z_k^{(n)}\}_{k=1}^{\infty}$ содержится в орициклическом

углу $O^n \Delta(\xi)$, $\lim_{k \rightarrow \infty} z_k^{(n)} = \xi$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} f(z_k^{(n)}) = \alpha$. Используя свойство орициклов, выделим из этого множества последовательностей такую подпоследовательность $\{z_{n_k}\}_{k=1}^{\infty}$, чтобы $\lim_{k \rightarrow \infty} z_{n_k} = \xi$, $\lim_{k \rightarrow \infty} \sigma(z_{n_k}, \Lambda(\xi)) = 0$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} f(z_{n_k}) = \alpha$. Отметим на $\Lambda(\xi)$ такую последовательность $\{t_k\}_{k=1}^{\infty}$, для которой $\sigma(z_{n_k}, t_k) = \sigma(z_{n_k}, \Lambda(\xi))$, $k = 1, 2, \dots$. Следовательно, $\lim_{k \rightarrow \infty} \sigma(z_{n_k}, t_k) = 0$, причем имеем $\lim_{k \rightarrow \infty} f(z_{n_k}) = \alpha$. Снова применяя известную теорему для нормальных непрерывных функций получим, что $\lim_{k \rightarrow \infty} f(t_k) = \alpha$. Поэтому $\alpha \in C(f, \xi, \Lambda(\xi))$, что противоречит предположению. Утверждение леммы 2 доказано.

Доказательство теоремы 1. Необходимость условий теоремы 1 непосредственно следует из утверждения леммы 2. Для доказательства достаточности условий теоремы 1 рассмотрим произвольный орициклический угол $O\Delta(\xi)$ и докажем, что справедливо равенство $C(f, \xi, O\Delta(\xi)) = C(f, \xi, \Lambda(\xi))$ для любого орицикла $\Lambda(\xi)$. Тем самым будет доказано утверждение теоремы 1. Возьмем произвольное значение $\alpha \in C(f, \xi, O\Delta(\xi))$. Пусть $\{t_n\}_{n=1}^{\infty}$ - такая последовательность точек $O\Delta(\xi)$, что $t_n \rightarrow \xi$ при $n \rightarrow \infty$ и $\lim_{k \rightarrow \infty} f(t_n) = \alpha$. Из этой последовательности можно извлечь подпоследовательность t_{n_k} , неевклидово расстояние которой до некоторого орицикла $\Lambda_1(\xi)$ стремится к нулю, Отметим на $\Lambda_1(\xi)$ такую последовательность $\{z_k\}_{k=1}^{\infty}$, для которой $\sigma(z_k, t_{n_k}) = \sigma(t_{n_k}, \Lambda_1(\xi))$, $k = 1, 2, \dots$. Следовательно, $\lim_{k \rightarrow \infty} \sigma(z_k, t_{n_k}) = 0$. Принимая во внимание, что $\lim_{k \rightarrow \infty} f(t_{n_k}) = \alpha$, снова в силу свойства нормальных непрерывных функций имеем $\lim_{k \rightarrow \infty} f(z_k) = \alpha$. Следовательно, $\alpha \in C(f, \xi, \Lambda_1(\xi))$ и, значит, согласно утверждению леммы 1, $\alpha \in C(f, \xi, \Lambda(\xi))$ для любого орицикла $\Lambda(\xi)$. Учитывая произвольность $O\Delta(\xi)$, отсюда получим утверждение теоремы 1.

Следствие. Пусть $f(z)$ - нормальная непрерывная функция в D . Для того, чтобы функция $f(z)$ имела в точке $\xi = e^{i\theta}$ и предел α , необходимо и достаточно существование равных пределов вдоль орициклов $\Lambda(\xi)$, всюду плотных на множестве орициклических углов $O\Delta(\xi)$ в точке $\xi = e^{i\theta}$.

Рассуждая по той же схеме, что и при доказательстве теоремы 1 с использованием вместо свойства нормальных непрерывных функций иметь одинаковые пределы на близких в смысле неевклидовой метрики последовательностях точек круга D того же свойства для произвольных гармонических функций при условии $C(f, \xi, O\Delta(\xi)) \neq \bar{R}$ (см. [1]), получим следующую теорему.

Теорема 2. Пусть $f(z)$ -произвольная гармоническая функция, определенная в D и в некоторой точке $\xi = e^{i\theta}$ единичной окружности Γ предельные множества $C(f, \xi, O\Delta(\xi)) \neq \bar{R}$ для произвольного орициклического угла $O\Delta(\xi)$. Тогда для того, чтобы точка $\xi = e^{i\theta} \in \Gamma$ была точкой из множества $K_*(f)$, необходимо и достаточно совпадение предельных множеств $C(f, \xi, \Lambda(\xi))$ для множества орициклов $\Lambda(\xi)$, всюду плотных на множестве орициклических углов $O\Delta(\xi)$.

Рассмотрим граничное поведение гармонических функций в точках множества $K_*(f)$,

Теорема 3. Пусть гармоническая в круге D функция $u(z)$ имеет конечный или бесконечный предел $\lim_{n \leftarrow \infty} u(z_n) = \alpha$ по некоторой последовательности точек $\{z_n\} \in \Lambda(\xi)$, где $\Lambda(\xi)$ -некоторый орицикл, $\lim_{n \rightarrow \infty} z_n = \xi \in K_*(f)$, $\lim_{n \leftarrow \infty} \sigma(z_n, z_{n+1}) = 0$ и допустим α не является орициклическим граничным значением функции $u(z)$ в точке ξ . Тогда функция $u(z)$ обладает в D последовательностью P' -точек $\{\xi_n\}$ и $\lim_{n \rightarrow \infty} \xi_n = \xi$.

Доказательство. Положим $\delta_n = \sigma(z_n, z_{n+1})$, где $n = 1, 2, \dots$. Предположим сначала, что существует такая последовательность точек $\{z'_{n_k}\}$, $k = 1, 2, \dots$,

$$z'_{n_k} \in h(\xi, \varphi_0), \lim_{k \rightarrow \infty} z'_{n_k} = \xi, \lim_{k \rightarrow \infty} \sigma(z_{n_k}, z'_{n_k}) = 0,$$

в которых имеют место неравенства

$$\left| u(z'_{n_k}) - \alpha \right| \geq \varepsilon_0, \text{ если } \alpha \text{ -конечное,}$$

$$\left| u(z'_{n_k}) \right| \leq \frac{1}{\varepsilon_0}, \text{ если } \alpha \text{ -бесконечное,}$$

где $\varepsilon_0 > 0$ – некоторое фиксированное число. Это значит, что удовлетворяются условия теоремы 3 из работы [6]. Поэтому из последовательности $\{z_n\}$ можно извлечь подпоследовательность $\{z_{n_k}\}$, которая является P' -последовательностью для функции $u(z)$, что и требовалось доказать. Теперь предположим, что $\lim_{\substack{z \rightarrow \xi \\ z \in \Lambda(\xi)}} u(z) = \alpha$. Рассмотрим

вложенную последовательность орициклических углов

$$O^1 \Delta(\xi) \supset O^2 \Delta(\xi) \supset \dots \supset O^n \Delta(\xi) \supset \dots,$$

стягивающихся к орициклу $\Delta(\xi)$. Так как, по условию значение α не является орициклическим граничным значением функции $u(z)$ в граничной точке ξ , то существует такое значение $\beta \in \bar{R}$, отличное от α , что в каждом орициклическом углу найдется последовательность $\{t_k^n\}_{k=1}^\infty$, для которой $\lim_{k \rightarrow \infty} u(t_k^n) = \beta$. Изменяя n получим множество последовательностей

$$t_1^1, t_2^1, \dots, t_k^1, \dots; t_1^2, t_2^2, \dots, t_k^2, \dots; t_1^n, t_2^n, \dots, t_k^n, \dots; \dots$$

Из этого множества последовательностей можно выбрать последовательность $\{t_{k_m}^m\}_{m=1}^\infty$ такую, что $\lim_{m \rightarrow \infty} \sigma(t_{k_m}^m, q_m) = 0$ и $\lim_{m \rightarrow \infty} u(t_{k_m}^m) = \beta$, где q_m – некоторая последовательность точек на орицикле $\Delta(\xi)$, стремящаяся к ξ . В силу предположения $\lim_{m \rightarrow \infty} u(q_m) = \alpha$ и, таким образом, опять выполнены условия теоремы 3 из работы [6]. Еще раз применяя утверждение этой теоремы завершим доказательство теоремы 3.

Замечание. Очевидно, что из существования углового или орициклического граничного значения в произвольной точке $\xi \in \Gamma$ следует отсутствие последовательности P' -точек в любом углу Штольца $\Delta(\xi)$ или соответственно в любом орициклическом углу $O\Delta(\xi)$, так как в противном случае предельные множества вдоль этих углов совпадали с \bar{R} , что невозможно.

Из теоремы 3 вытекает следующее утверждение.

Теорема 4. Для того, чтобы гармоническая в D функция $u(z)$ имела в точке $\xi \in K_*(f)$ орициклическое граничное значение α необходимо и достаточно, чтобы существовал конечный или бесконечный предел $\lim_{n \leftarrow \infty} u(z_n) = \alpha$ по некоторой последовательности $\{z_n\} \in \Delta(\xi)$, $n=1,2,\dots$, где $\Delta(\xi)$ – некоторый фиксированный орицикл, $\lim_{n \leftarrow \infty} \sigma(z_n, z_{n+1}) = 0$ и нет P' -последовательностей в любом орициклическом углу $O\Delta(\xi)$.

Необходимость условий теоремы 4 очевидна.

Достаточность условий теоремы 4 непосредственно следует из утверждения теоремы 3.

Граничному поведению функций посвящены многочисленные работы. Отметим, в частности, работы [7-10].

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Берберян С.Л., Гаврилов В.И., *Предельные множества непрерывных и гармонических функций по некасательным граничным путям*, Mathematica Montisnigri, 1993, Vol.1, 17-25.
- [2] Bagemihl F., *Horocyclic boundary properties of meromorphic functions*, Annal. Acad. Scien. Fennicae, 1966, Ser. AI, № 385, 1-18.
- [3] Гаврилов В.И., *О граничных теоремах единственности*, Изв. АН Арм ССР, 1969, т.4, N3, стр.244-258.
- [4] Гаврилов В.И., *О распределении значений мероморфных в единичном круге функций, не являющихся нормальными*, Матем. сбор., 1965, т.67(109), №3, 408-427.
- [5] Берберян С.Л., *О распределении значений гармонических функций в единичном круге*, Изв. вузов, математика, 2011, №6, 12-19.
- [6] Берберян С.Л., *Об угловых граничных значениях нормальных непрерывных функций*, Изв. вузов, математика, 1986, №3, 22-28.
- [7] Pavicevic Z., *Meromorphic functions generating normal families in a arbitrary open subset of the unit disc*, New Zeland Journal of Mathematics , 1999 , vol.28, 89-106.
- [8] Павичевич Ж., Шушич Е., *Применение циклических свойств динамических систем к изучению граничных пределов произвольных функций*, Доклады РАН, 2002, т. 387, №1, 16-18.
- [9] Rung D. C., *Asymptotic values of normal subharmonic functions*, Math. Zeitschr., 1964, vol.84, №1, 9-15.
- [10] Dragosh S., *Horocyclic cluster sets of functions defined in the unit disc*, Nagoya Math.J., 1969, vol.35, 53-82.

РОССИЙСКО-АРМЯНСКИЙ (СЛОВЯНСКИЙ) УНИВЕРСИТЕТ, ЕРЕВАН, АРМЕНИЯ

E-mail address: samvel357@mail.ru

Поступила в редакцию 20-го ноября 2012 г.